



(baclofen | баклофен)

Миорелаксант центрального действия. Препарат первого выбора при болезненных мышечных спазмах.

Гусев Е.И., Бойко А.Н., Столяров И.Д. Рассеянный склероз 2009, 291 стр.

Единственный в России миорелаксант тройного действия. Баклосан включен в Европейские и Американские стандарты лечения спастичности. Баклосан входит в Федеральный льготный список. Снимает напряжение и выключает боль.

Улучшение качества жизни больных с мышечно-тоническим синдромом

Оптимальная схема - уверенность в результате!



Боль в спине	Слабая	Умеренная	Выраженная	Быструмгель	+	+
по 1/2 табл: 5 мг.						
3 раза в день*	30 мг. в сутки:					
по 1 табл 10 мг.						
3 раза в день*	75 мг. в сутки:					
по 1 табл. 25 мг.						
3 раза в день*						

* Средней терапевтической дозы достигают к третьему дню терапии путем титрования: напр., по 1/2 табл. 3 раза в день.

Дополнительная информация: Баклосан. Возможности фармакологической терапии в неврологии.

Методические рекомендации для врачей - Введение в проблему регуляции мышечного тонуса.

- Нейромедиаторы и рецепторы торможения
- Механизм действия и области применения
- Спастичность при рассеянном склерозе
- Спастичность при спинальных травмах
- Общие принципы назначения и режимы дозирования. Интратекальное применение
- Детский церебральный паралич
- Перспективы применения. Баклофен в лечении алкогольной и наркотической зависимости
- Литература Баклосан (баклофен) в лечении болей в спине: результаты многоцентрового исследования