



Цервицит - воспаление слизистой оболочки шейки матки. Инфекционный цервицит чаще возникает при заболеваниях, передающихся половым путём (ЗППП). Его могут вызывать хламидии (*Chlamydia trachomatis*), гонококки (*Neisseria gonorrhoeae*), ВПГ, трихомонады (*Trichomonas vaginalis*), реже - другие микроорганизмы. При хроническом цервиците патогенные микроорганизмы выявляют крайне редко.

Частота. Цервицит распространён среди сексуально активных женщин. Цервицит при гонорее - 166 на 100000 (у 2% сексуально активных женщин моложе 30 лет). Хламидийный цервицит - 1040 на 100 000 (около 15% женщин). Цервицит при трихомониазе - 1200 на 100 000 (у 5-25% женщин).

Факторы риска. Беспорядочные половые связи. ЗППП в анамнезе. Послеродовой период.

Лечение цервицита

При инфекционной природе заболевания - выявление возбудителя и проведение этиологического лечения (одновременно проводят лечение полового партнёра).

Необходимо учитывать, что нередко больные страдают смешанной инфекцией (например, гонореей и хламидиозом одновременно).

Хронический цервицит при отсутствии возбудителей в биоптатах и бактериальных посевах можно лечить при помощи криохирургии.