



Информация для специалистов по защите информации !

Утверждаю

Руководитель Департамента
Государственного контроля лекарственных средств
и медицинской техники
Минздрава России



АКИМОЧКИН В.Е.

Одобрено

Фармакологическим комитетом
Минздрава России



ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата
ЛОЦЕРИЛ
LOCERYL®

Регистрационное удостоверение №



Лекарственная форма : раствор для наружного применения

СОСТАВ: 100 мл раствора содержат:

Активное вещество: аморолфина гидрохлорид - 64 мг, что соответствует аморолфину
основанию 50 мг,

Вспомогательные вещества: (метакриловой кислоты сополимер, глицерола триацетат,
этил ацетат, бутил ацетат, этанол безводный).



ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Противогрибковое средство.

Код АТХ (D01AE16)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Противогрибковый препарат для наружного применения. Оказывает фунгистатическое и фунгицидное действие, обусловленное повреждением цитоплазматической мембраны гриба путём нарушения биосинтеза стеролов. Обладает широким спектром действия, активен в отношении грибов рода *Trichophyton*, *Candida*, *Pityrosporum*, *Cryptococcus*, *Mycrosporum*, *Epidermophyton*, *Alternaria*, *Hendersonula*, *Scopulariopsis*, *Cladosporium*, *Fonseceae*, *Wangiella*, *Coccidoides*, *Histoplasma*, *Sporothrix*.



ФАРМАКОКИНЕТИКА

При нанесении на ногти проникает в ногтевую пластинку и далее в ногтевое ложе (практически полностью в течение первых 24 часов). Эффективная концентрация сохраняется в поражённой ногтевой пластинке в течение 7-10 дней уже после первой аппликации. Системная абсорбция незначительна: концентрация в плазме находится ниже предела чувствительности методов определения (менее 0,5 нг/мл).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ лечение поражений ногтей, вызванных различными видами грибов (в том случае, если поражено не более 2/3 ногтевой пластины); профилактика грибковых поражений ногтей.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к препарату

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Наружно. Наносят на поражённые ногти пальцев рук или ног 1-2 раза в неделю следующим образом: До применения препарата удаляют по возможности поражённые участки ногтя (особенно на его поверхности) с помощью прилагаемой пилки для ногтей. Затем поверхность ногтя очищают и обезжиривают прилагаемым тампоном, смоченным спиртом.

Обработку ногтей пилкой и тампоном со спиртом необходимо проводить перед каждым применением препарата. Обмакнуть лопаточку в раствор. Лопаточку следует вынимать из флакона, не касаясь его горлышка, не следует стирать излишки раствора о горлышко флакона. Раствор наносят на всю поверхность поражённого ногтя с помощью лопаточки.

Вышеописанную процедуру повторяют для каждого поражённого ногтя. Протереть горлышко флакона тем же тампоном, которым обрабатывали ноготь и плотно закрыть флакон сразу же после использования. Дать раствору высохнуть примерно в течение 3-х минут. Лопаточку протереть использованным тампоном. Избегать контакта обработанных ногтей и тампона. Использованный тампон выбросить.

Лечение следует продолжать до регенерации ногтя и полного излечения поражённого участка.

Средняя длительность лечения составляет 6 месяцев для ногтей на руках и 9-12 месяцев для ногтей на ногах.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Возможно жжение в области ногтей.

ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДИАТРИИ

Клинические данные по применению Лоцерила у детей отсутствуют, поэтому его не следует назначать детям.

БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Не рекомендуется применение препарата во время беременности и лактации.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Не выявлено.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ пилки, использованные для обработки поражённых ногтей, не следует использовать для обработки здоровых ногтей; лица, работающие с органическими растворителями, должны надевать непроницаемые перчатки для защиты ногтей, покрытых раствором; во время лечения следует избегать применения накладных искусственных ногтей и пользоваться косметическим лаком для ногтей тампон содержит легковоспламеняющееся вещество.

ФОРМА ВЫПУСКА

Флаконы по 2,5 и 5 мл

В упаковке: тампоны (30 шт.), смоченные 70% изопропиловым спиртом, в пакетиках из фольги; 10 лопаточек; 30 пилочек для ногтей.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

При температуре не выше 30° С, в недоступном для детей месте, в закрытой коробке.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта

Производитель:

Лаборатории ГАЛДЕРМА С.А.