



Регистрационный номер:

Торговое название препарата

БРУСНИВЕР®

Лекарственная форма

сбор растительный- сырье измельченное

сбор растительный - порошок

Состав

Брусники листьев 50%

Шиповника плодов 20%

Зверобоя травы 20%

Череды травы 10%

Описание

**Измельченное сырье.** Смесь неоднородных частиц листьев, стеблей, цветков, околоплодников, плодов, лепестков, веточек и цветоносов от светло-зеленого до темно-зеленого, реже от светло-коричневого до коричневого, оранжево-красного, желтовато-белого цвета.

Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, вяжущий.

**Порошок.** Смесь неоднородных частиц листьев, стеблей, цветков, околоплодников, плодов, лепестков, веточек и цветоносов серовато-зеленого цвета с беловато-желтыми и коричневато-красными, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями.

Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное, противовоспалительное и диуретическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Настой и отвар сбора обладают противомикробным (в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протей и некоторых других микроорганизмов), противовоспалительным, диуретическим действием.

Показания к применению

Настой и отвар применяют в качестве противомикробного, противовоспалительного и диуретического средства в комплексной терапии острых и хронических заболеваний в урологии (цистит, уретрит, простатит), гинекологии (вагинит, вульвит неспецифической этиологии) и проктологии (проктит, воспаление геморроидальных узлов, анальные трещины, колит).

#### Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

#### Способ применения и дозы

Бруснивер применяют внутрь или местно, в виде настоя или отвара.

**Отвар:** около 8 г (4 чайные ложки) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 500 мл ( 2,5 стакана) кипящей воды, настаивают в течение 1 часа, кипятят под крышкой на слабом огне в течение 15 минут, повторно настаивают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают.

**Настой:** 2 фильтр-пакета (4 г) сбора помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл ( 1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 30 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают.

Перед употреблением отвар (настой) рекомендуется взбалтывать.

Внутрь отвар (настой) назначают в теплом виде по 1/4-1/3 стакана 3-4 раза в сутки.

Местно теплый отвар (настой) в неразбавленном виде применяют для микроклизм по 25-50 мл; для орошений, спринцеваний, ванночек, примочек отвар (настой) разбавляют в 2-4 раза.

В урологии отвар (настой) применяют внутрь по указанной схеме в течение 1-3 недель. При хроническом течении заболевания курс лечения может быть увеличен до нескольких месяцев по согласованию с лечащим врачом. Одновременно отвар (настой) можно применять местно (микроклизмы) в течение 1-2 недель 1-2 раза в сутки.

В гинекологии отвар (настой) применяют внутрь по указанной схеме в течение 2-4 недель и одновременно местно (ванночки, орошения, спринцевания, примочки, микроклизмы) 1-2 раза в сутки.

В проктологии отвар (настой) применяют в течение 1-3 недель одновременно внутрь по 1/4-1/3 стакана и местно в виде теплых примочек 1-3 раза в сутки и микроклизм по 50 мл на ночь.



При колитах отвар (настой) применяют только внутрь.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Форма выпуска**

Измельченное сырье по 25 г, 30 г, 35 г, 50 г, 75 г, 100 г в пачках картонных с внутренним пакетом.

Порошок в фильтр-пакетах по 2.0 г; по 10 шт. или 20 шт. в пачках картонных.

**Условия хранения**

Хранят в сухом, защищенном от света месте; приготовленный отвар (настой) – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в местах, недоступных для детей.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта.