



Информация для диетологов и специалистов по питанию
Инфезол® 40

Парантеральное питание 4%-й раствор аминокислот с высокой биологической активностью благоприятный эффект, связанный с уменьшением расхода белка для энергетического обмена благодаря подводу ксилита поддержание водного и электролитного баланса Состав

В одном литре содержится:	L-аланина	4,00 г	
(в пересчете на значение микроэлементов)	Содержание энергии (общее)	155 кДж/л	Общий

Фармакотерапевтическая группа

Инфузионный раствор. Инфузионный раствор L-аминокислот с углеводами и электролитами

Показания к применению

Парентеральное питание. Профилактика и терапия состояний белкового дефицита различного



Противопоказания

Тяжелые поражения печени, определенные нарушения белкового обмена, лактатацидоз, острые

Побочные действия

Обычно Инфезол 40 переносится хорошо. Очень редко могут иметь место тошнота, рвота, озноб

У грудных детей слишком быстрое вливание препарата может привести к гиперкалиемии и ацидозу

Взаимодействие с другими средствами



В связи с повышенным риском микробного загрязнения и несовместимости, растворы содержатся в отдельных флаконах

Введенный вместе с Инфезолом 40 тиамин (витамин B1) может расщепляться.

Руководство по дозировке

Для взрослых: от 0,6 до 1,0 г аминокислот (до 25 мг Инфезола 40 на кг веса тела / в сутки).

При катаболических состояниях: от 1,3 до 2,0 г аминокислот (до 50 мл Инфезола 40 на кг веса т

В грудном и детском возрасте: от 1,5 до 2,5 г аминокислот (до 60 мл Инфезола 40 на кг веса т

Особые указания

В связи с тем, что в Инфезоле 40 содержится дисульфит натрия, препарат нельзя применять

Форма выпуска



Инфузионный раствор в стеклянных флаконах по 100, 250 и 500 мл.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 С! Лекарственное средство

Срок годности: 24 месяца.

Условия отпуска: По рецепту врача!