



Биологически активная добавка к пище

ТУ 9358-004-00155547-08

Состав

1 капсула содержит 700 единиц фермента лактазы.

Вспомогательные вещества: мальтодекстрин, капсулы твердые желатиновые.

Область применения:

Рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника фермента лактазы.

Фермент лактаза расщепляет и обеспечивает всасывание дисахарида лактозы, поступающий с пищей (чаще в составе молока и молочных продуктов). Дефицит фермента лактазы может быть врожденным (первичная лактазная недостаточность) или приобретенным (вторичная лактазная недостаточность), возникает на фоне инфекционных, иммунных, воспалительных и атрофических изменений в кишечнике. В случае дефицита данного фермента при употреблении продуктов питания, содержащих лактозу, развиваются симптомы нарушения пищеварения: метеоризм, диарея, кишечные спазмы.

Применение фермента лактазы помогает эффективнее переваривать грудное молоко, не прерывая грудное вскармливание, и позволяет полноценно использовать в рационе питания ребенка молочные продукты.



Способ применения

Рекомендуемая дозировка детям до года - одна капсула на одно кормление.



Дети до года, находящиеся на грудном вскармливании, — перед началом каждого кормления грудью в 30 мл предварительно сцеженного грудного молока добавляют содержимое капсулы, через несколько минут ребенку из бутылочки дают ферментированное молоко, а затем докармливают грудью.

Дети до 1 года, находящиеся на искусственном вскармливании, - содержимое капсулы добавить в порцию молочного питания (1 капсула на 100 мл молока). Кормление начать через несколько минут.

Детям от 1 года до 5 лет - содержимое 1-5 капсул (в зависимости от количества молока) добавить в негорячую (ниже +55°С) пищу, содержащую молоко.



Если ребёнок страдает от аллергии на лактозу (вредно для здоровья), то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу.

Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу. Если у ребёнка аллергия на лактозу, то ему не следует употреблять продукты, содержащие лактозу.