



Информация для потребителей по использованию вождения

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

**ВИТЕЛЬ В РОССИИ И СНГ: ЛАБОРАТОРИИ БУШАРА РЕКОРДАТИ
ФИК МЕДИКАЛЬ**

Полидекса с фенилэфрином ~ Polydexa with Phenylephrine

Спрей для носа



Форма выпуска

Спрей для носа: флакон с распылителем емкостью 15 мл.

Состав на 100 мл



Неомицина сульфат: 1 г соотв. 650000 Ед.

Полимиксина В сульфат: 1000000 Ед.

Метасульфобензоат натрия: 25 мг.

Фенилефрин гидрохлорид: 250 мг.

Экспциенты: метилпарагидроксибензоат, хлорид лития, лимонная кислота, гидроксид лития

Показания

Местное лечение ринофарингитов и синуситов.

Дозировка и способ применения

Взрослые: однократная пульверизация в каждый носовой ход 3-5 раз в день в течение 5-10 д

Дети в возрасте от 2,5 до 15 лет: однократная пульверизация в каждый носовой ход 3 раза в д

Флакон следует держать в вертикальном положении.

Курс лечения не должен превышать 10 дней.

Противопоказания

Не применять у пациентов с риском возникновения закрытоугольной глаукомы.

Не применять у детей до 2,5 лет в связи с высокой чувствительностью к симпатомиметикам.

Не применять вместе с ингибиторами моноаминоксидазы в связи с риском повышения артериального давления.

Гиперчувствительность к одному из компонентов, в частности, к неомицину, или другим антибиотикам.

Заболевания почек (альбуминурия).

Беременность или кормление грудью.

Предупреждения и меры предосторожности



Не применять для промывания придаточных пазух носа.

Не применять у больных с почечной недостаточностью. В связи с наличием симпатомиметика препарат может повышать артериальное давление.

Вниманию спортсменов: препарат содержит компоненты, которые могут дать положительный результат в допинг-контроле.

Побочные эффекты

Интраназальное применение может крайне редко вызвать кожные аллергические реакции.

Свойства



Препарат обладает сосудосуживающим, противовоспалительным и антибактериальным действием.

Эффективность препарата ПОЛИДЕКСА обусловлена сочетанием противовоспалительного и антибактериального действия.

Инструкция

Дополнительная информация: Оптимизация лечения больных с хроническим гнойно-полипозным ринитом.